


SỰ KHÁC NHAU GIỮA BỆNH CUSHING VÀ HỘI CHỨNG CUSHING

Võ Công Định Y5 CTUMP

Có 1 chất quan trọng trong cơ thể của bạn gọi là glucocorticoid, là 1 loại hormone steroid được sản xuất bởi tuyến thượng thận. Glucocorticoid- đặc biệt là cortisol giúp nhiều quá trình diễn ra, như chuyển hóa và chống nhiễm trùng. Glucocorticoid (cả tự nhiên và tổng hợp) đều được sử dụng trong điều trị dị ứng, các bệnh về hô hấp và da.

Hội chứng Cushing là 1 rối loạn hormone

Hội chứng Cushing là 1 thuật ngữ dùng để mô tả 1 nhóm triệu chứng xảy ra ở những người có nồng độ cortisol quá cao kéo dài (hypercortisolism). Phần lớn những người mắc hội chứng Cushing do họ uống đều đặn quá nhiều cortisol vào trong cơ thể. Do đó được gọi là “ **exogenous** “ : hội chứng Cushing có nguồn gốc ngoại sinh . Một số ít BN khác mắc hội chứng Cushing do tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều cortisol : gọi là “ **endogenous**” (hội chứng Cushing nguồn gốc nội sinh).



Bệnh Cushing là 1 dạng trong hội chứng Cushing

Bệnh Cushing là dạng phổ biến nhất của hội chứng Cushing có nguồn gốc nội sinh. Nó gây ra do khối ở tuyến yên tiết ra quá nhiều hormone gọi là ACTH. Thông thường, khối u này lành tính, không giống như ung thư, khối u lành tính chỉ khu trú 1 vùng và không

có xu hướng lan rộng. Sau khi bạn được chẩn đoán hội chứng Cushing, bác sĩ sẽ tiếp tục chẩn đoán nguyên nhân gây nên hypercortisolism.

<http://www.aboutcushings.com/understanding-cushings-disease/causes-and-differences/>

