

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG BỆNH LÀNH TÍNH CỦA NỘI MẠC TỬ CUNG

I. Câu hỏi mức độ nhớ lại

- Về polyp nội mạc tử cung, câu nào sau đây đúng?**
 - Là sự tăng sinh của toàn bộ lớp nội mạc tử cung.
 - @Có thể gặp ở tuổi mãn kinh.
 - Có thể không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.
 - Khám摸 vệt thì không bao giờ thấy được
 - Có thể chẩn đoán dễ dàng với siêu âm bụng.
- Trong polyp nội mạc tử cung, tất cả những hình ảnh qua chụp buồng tử cung – vòi trứng cản quang sau đây đều là điển hình, NGOẠI TRỪ:**
 - Có dạng hình khuyết.
 - Cản quang đồng nhất.
 - @Bờ nhám nhòe.
 - Kích thước có thể lớn hoặc nhỏ tùy trường hợp.
 - Hình ảnh khuyết thấy cả trên phim thẳng lẫn phim nghiêng.
- Ở phụ nữ mãn kinh, bề dày lớp nội mạc tử cung đo được trên siêu âm là bao nhiêu thì có thể kết luận là có tăng sinh nội mạc tử cung:**
 - @Trên 4 mm.
 - Trên 6 mm.
 - Trên 8 mm.
 - Trên 10 mm.
 - Trên 12 mm.

II. Câu hỏi mức độ hiểu

- Thủ thuật hoặc phẫu thuật nào sau đây có khả năng gây dính lòng tử cung:**
 - Nạo thai to.
 - Mổ bóc nhân xơ tử cung.
 - Nạo sinh thiết.
 - Mổ tạo hình tử cung.
 - @Tất cả thủ thuật và phẫu thuật trên.
- Dính lòng tử cung có thể đưa đến hậu quả nào sau đây:**
 - Cường kinh.
 - Thống kinh.
 - Vô kinh.
 - Cả A, B, C đều đúng.
 - @Chỉ có B và C đúng.
- Chọn một câu đúng sau đây về điều trị dính lòng tử cung sau sang chấn:**
 - Nếu đã chẩn đoán được, cần điều trị cho tất cả các trường hợp.

- B. Nên chờ một thời gian cho chỗ dính ổn định về phương diện mô học, sau đó mới điều trị.
 - C. Điều trị chủ yếu là bằng các loại thuốc làm tiêu protein (ví dụ : alpha chymotrypsin).
 - D. @Để tránh tái dính sau điều trị, có thể đặt một vòng tránh thai vào buồng tử cung.
 - E. Thường phối hợp thêm các thuốc loại progestogen sau khi điều trị gỡ dính.
- 7. Tất cả các câu sau đây về teo nội mạc tử cung đều đúng, NGOẠI TRỪ:**
- A. @Chỉ xảy ra ở phụ nữ mãn kinh, không khi nào có ở phụ nữ trong tuổi hoạt động sinh dục.
 - B. Các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán chỉ cần thiết khi có triệu chứng xuất huyết âm đạo bất thường.
 - C. Thường hay có kèm theo dính lòng tử cung, nhất là ở vùng đáy tử cung.
 - D. Hay có kèm những chấm xuất huyết nhỏ ở niêm mạc âm đạo hay nội mạc tử cung.
 - E. Nếu cần phải điều trị chủ yếu là dùng estrogen liều thấp.
- 8. Trong các loại tăng sinh nội mạc tử cung dưới đây, loại nào có tiên lượng xấu nhất:**
- A. Tăng sinh nội mạc.
 - B. Tăng sinh nội mạc đa polyp.
 - C. Tăng sinh nội mạc dạng nang tuyến.
 - D. Tăng sinh nội mạc đơn giản.
 - E. @Tăng sinh nội mạc không điển hình.
- 9. Trong tăng sinh nội mạc không điển hình, hình ảnh mô học nào sau đây có giá trị nhất:**
- A. Các tuyến tăng sinh kích thước không đều nhau.
 - B. Nhân to, tăng sắc, bắt màu kiềm.
 - C. Hiện tượng phân bào tăng.
 - D. @Biểu mô tuyến cuộn lại vào trong lòng ống, mô đệm biến mất.
 - E. Các tuyến phình to không đều, biểu mô thành tuyến mỏng đi.

III. Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng

- 10. Về điều trị tăng sinh nội mạc tử cung, cắt tử cung toàn phần có chỉ định trong tất cả các trường hợp sau, NGOẠI TRỪ:**
- A. Tăng sinh đơn giản ở phụ nữ trên 40 tuổi, có kèm theo sang thương phối hợp như u xơ tử cung, lạc nội mạc vào lớp cơ tử cung.
 - B. Tăng sinh dạng nang tuyến, không hiệu quả sau điều trị bằng progestogen.
 - C. @Tăng sinh không điển hình ở phụ nữ trẻ nhưng có triệu chứng rong huyết.
 - D. Tăng sinh không điển hình ở phụ nữ béo phì, nhiều con, có kèm huyết áp cao.
 - E. Tăng sinh không điển hình ở phụ nữ trên 40 tuổi.