

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG ĐA THAI

I. Câu hỏi mức độ nhớ lại

1. Song thai một trứng: nếu phát triển thành hai bánh rau và hai buồng ối riêng biệt là do hợp tử phân chia vào thời điểm nào? Chọn câu ĐÚNG:

- A. @Rất sớm, 1-3 ngày sau thụ tinh.
- B. 5 ngày sau thụ tinh.
- C. 8-10 ngày sau thụ tinh.
- D. Rất muộn sau thụ tinh .

2. Trong đỡ song thai, sau khi đã sổ thai thứ nhất, động tác đầu tiên cần làm tiếp theo là, chọn câu ĐÚNG:

- A. Tăng co.
- B. Phá ối.
- C. @Khám âm đạo để xác định lại ngôi của thai thứ hai.
- D. Không xử trí gì, chờ để tự nhiên thai thứ hai

3. Về song thai hai trứng chọn câu ĐÚNG:

- A. Gặp nhiều hơn so với song thai một trứng.
- B. @Hai tinh trùng có thể từ một lần giao hợp hay hai lần giao hợp.
- C. Hai sự thụ tinh có thể xảy ra trong hai chu kỳ kinh tiếp nhau.
- D. Có thể có hiện tượng thông nối mạch máu giữa hai thai.

4. Các biến chứng sau đây thường gặp trong song thai, NGOẠI TRỪ:

- A. @Thai quá ngày.
- B. Nhiễm độc thai.
- C. Sanh non.
- D. Băng huyết sau đẻ.

5. Đặc điểm của song thai đồng hợp tử là, chọn câu ĐÚNG:

- A. Hai thai luôn cùng một loại ngôi.
- B. Hai thai luôn luôn có cùng túi ối.
- C. @Hai thai luôn luôn có cùng giới tính.
- D. Là kết quả của sự thụ tinh hai trứng rụng trong cùng một chu kỳ kinh.

6. Chẩn đoán phân loại song thai dựa vào, chọn câu ĐÚNG:

- A. Các dấu hiệu lâm sàng
- B. Xét nghiệm định lượng β hCG
- C. Siêu âm thai
- D. @Triệu chứng lâm sàng và siêu âm

Song thai là một thai nghén được gọi là, chọn câu ĐÚNG:

- A. Bệnh lý
- B. Có nguy cơ cao trong thời kỳ mang thai
- C. Có nguy cơ trong thời kỳ chuyển dạ

- D. @Có nguy cơ, bệnh lý, tử vong chu sản cao trong thời kỳ mang thai và trong chuyển dạ

Nguyên nhân gây song thai đồng hợp tử là do, chọn câu ĐÚNG:

- A. Tính chất di truyền
B. Tính chất gia đình
C. @Do tính chất đột biến
D. Có tính chất dân tộc, gia đình, di truyền

Chọn câu ĐÚNG về yếu tố phân biệt sinh đôi đồng hợp tử và dị hợp tử:

- A. Giới tính của thai
B. Đặc điểm của bánh rau
C. Đặc điểm của buồng ối
D. @Nguồn gốc phát sinh của thai

Chọn câu đúng nhất khi nói về cách phân biệt song thai đồng hợp tử và dị hợp tử:

- A. Tính chất của ngôi thai
B. Giới của thai
C. Khi có hệ thống tuần hoàn nối thông
D. Chỉ chẩn đoán phân biệt sau khi kiểm tra xem bánh rau có hệ thống tuần hoàn nối thông hay không
E. @Đặc điểm của bánh rau và buồng ối

Các câu dưới đây là đúng khi nói về song thai dị hợp tử, NGOẠI TRỪ:

- A. Song thai dị hợp tử thường gặp hơn song thai đồng hợp tử
B. Là kết quả của sự thụ tinh giữa hai trứng và hai tinh trùng khác nhau.
C. Đặc điểm giải phẫu là hai bánh rau, hai buồng ối riêng biệt.
D. @Hai thai luôn cùng giới.

Chọn câu ĐÚNG về đặc điểm của song thai đồng hợp tử:

- A. Hai thai có cùng bánh rau
B. Hai thai có cùng giới tính
C. @Hai thai có cùng bộ nhiễm sắc thể.
D. Hai thai phát triển tương đương nhau

Chọn câu ĐÚNG về thời điểm phát hiện sớm song thai sớm trên siêu âm:

- A. Thai 4 tuần tuổi
B. @Thai 6 tuần tuổi
C. Thai 8 tuần tuổi
D. Thai 10 tuần tuổi

7. Tỷ lệ tử vong chu sản trong sinh đôi cao chủ yếu là do:

- A. Thai chậm phát triển trong tử cung
B. Xảy ra truyền máu cho - nhận
C. Tai biến đỡ đẻ
D. @Do đẻ non

8. Các chỉ định mổ lấy thai sau đây trong song thai đều đúng cho trọng lượng thai trung bình, NGOẠI TRỪ:

- A. Con so, thai thứ nhất ngôi ngược
B. Con rạ, thai thứ nhất ngôi ngang
C. Cả hai thai là ngôi đầu cùng xuống

D. @Thai thứ hai ngôi ngược

II. Câu hỏi mức độ hiểu

9. Sản phụ con rạ, song thai. Sau khi đẻ thai thứ nhất khám lại thấy ngôi thứ hai là ngôi ngang, ối còn, cổ tử cung còn mở hết. Hướng xử trí hợp lý nhất cho ngôi thứ hai này là:

- A. Cho tăng co với oxytocin.
- B. Bấm ối, nội xoay thành ngôi mông rồi chờ đẻ tự nhiên.
- C. @Bấm ối, nội xoay thai và đại kéo thai.
- D. Mổ lấy thai.

10. Phân loại song thai bằng siêu âm được làm vào tuổi thai nào là sớm nhất, chọn câu ĐÚNG:

- A. Trước 6 tuần
- B. @Từ 7 - 12 tuần
- C. Từ 13 - 22 tuần
- D. Sau 22 tuần

11. Chỉ có thể tiến hành nội xoay thai thứ hai trong đỡ đẻ song thai khi, chọn câu ĐÚNG:

- A. Ngôi đầu, tử cung co kém
- B. Ngôi ngược, tử cung co kém
- C. @Thai nhỏ, ối còn, ngôi ngang
- D. Ngôi ngang, ối đã vỡ, tử cung co mạnh

III. Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng

12. Hội chứng truyền máu thường xảy ra ở loại song thai nào sau đây, chọn câu ĐÚNG:

- A. Song thai hai bánh rau hai buồng ối
- B. Song thai một bánh rau một buồng ối
- C. @Song thai một bánh rau hai buồng ối
- D. Song thai dính nhau

13. Nếu thai thứ hai ngôi đầu, sau đẻ thai thứ nhất 10 phút mà cơn co tử cung không xuất hiện trở lại thì thái độ xử trí đúng nhất là, chọn câu ĐÚNG nhất:

- A. Chờ đợi và không can thiệp gì
- B. Bấm ối và chờ đợi
- C. @Truyền Oxytocin, bấm ối cố định ngôi cho sản phụ rặn.
- D. Mổ lấy thai