

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG KHÁM THAI VÀ QUẢN LÝ THAI NGHÉN

I. Câu hỏi mức độ nhớ lại

1. Thai phụ nên được chủng ngừa một cách thường qui loại thuốc chủng nào sau đây:
A. BCG.
B. @VAT.
C. DTC.
D. Poliomyelite.
2. Chất nào sau đây thai phụ nên dùng thêm khi có thai:
A. Vitamine A.
B. Vitamine K.
C. Vitamine D.
D. @Calcium.
3. Tiêm đủ vaccin uốn ván đúng là:
A. @Mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 1 tháng.
B. Tiêm luôn hai mũi trong một tuần cho tiện
C. Không cần quan tâm đến khoảng cách giữa các mũi tiêm
D. Mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 2 tuần
4. Thai phụ cần nghỉ làm việc trước khi đẻ:
A. Không cần.
B. Hai tuần.
C. @Một tháng.
D. Một tuần
5. Triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất đi kèm với chảy máu trong trường hợp nghi chữa ngoài tử cung là:
A. Buồn nôn và nôn
B. Đau bụng vùng thượng vị
C. @Đau bụng vùng hạ vị
D. Đau vùng thắt lưng
6. Tính chất ra máu âm đạo trong chữa ngoài tử cung có đặc điểm:
A. Ra máu hồng
B. Ra máu đỏ tươi
C. Ra máu nâu, loãng
D. @Ra máu đen có gợn như bã cà phê
7. Trong sẩy thai, ra máu âm đạo thường là:
A. Ra máu ít một kèm đau bụng
B. Ra máu cá nhiều không kèm đau bụng
C. Ra máu đỏ nhiều không kèm đau bụng

- D. @Ra máu đỏ kèm theo đau bụng
8. **Hiện nay Bộ Y tế quy định trong thai kỳ người phụ nữ phải đi khám ít nhất là:**
- A. . @3 lần
 - B. 4 lần
 - C. 5lần
 - D. Khi có triệu chứng bất thường.
9. **Trong khám thai, tiền sử quan trọng nhất cần hỏi thai phụ là:**
- A. @Tiền sử sản khoa,
 - B. Tiền sử phụ khoa
 - C. Tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình
 - D. Tiền sử hôn nhân
10. **Khám thai trong 3 tháng cuối cần phát hiện ở thai phụ:**
- A. Ngày kinh cuối cùng
 - B.. @Các triệu chứng của tăng huyết áp
 - C. Tiền sử sản khoa
 - D . Tiền sử phụ khoa
11. **Đăng ký quản lý thai nghén ở thời điểm nào là tốt nhất:**
- A. Ngay từ quý đầu của thai nghén
 - B.. @ Ngay khi phát hiện có thai
 - C. Từ quý hai của thai nghén
 - D. Từ quý ba của thai nghén
12. **Khi khám thai xong, cần:**
- A. Lên lịch khám lần sau nếu thai bình thường
 - B. Hướng dẫn thai phụ đi hội chẩn chuyên khoa nếu thấy bất thường
 - C. Dặn dò thai phụ trong khi mang thai, nếu thấy các triệu chứng bất thường như ra máu, đau bụng từng cơncần quay lại tái khám ngay không chờ đến lịch.
 - D. @Cả 3 ý trên
13. **Đối tượng phụ nữ được quản lý thai nghén đúng nhất là:**
- A. Phụ nữ có nguy cơ cao.
 - B. Những phụ nữ đến khám thai tại cơ sở y tế.
 - C. Những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
 - D. @ Tất cả những phụ nữ có thai.
14. **Nếu thấy thai nghén phát triển bình thường, mẹ khỏe thì không cần tái khám chờ chuyển dạ rồi mới đến viện:**
- A. Đúng
 - B. @Sai
15. **Cần phải luôn dặn dò sản phụ tái khám ngay khi có triệu chứng bất thường chứ không cần theo phiếu hẹn:**
- A. @Đúng
 - B. Sai
16. **Quản lý thai nghén tốt có thể giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm các tai biến sản khoa:**

- A. @Đúng
- B. Sai

17. **Phân loại thai nghén bình thường hay nguy cơ cao là việc làm của công tác quản lý thai nghén:**

- A. @Đúng
- B. Sai

18. **Trong quản lý thai nghén: Quản lý thai nghén được thực hiện đến hết thời kỳ hậu sản.**

- A. @Đúng
- B. Sai

19. **Khi chậm kinh có đau bụng, ra máu đen, phải nghĩ ngay tới CNTC:**

- A. @Đúng
- B. Sai

20. **Mỗi lần có thai, người phụ nữ phải khám thai ít nhất là ...(3 lần)...lần.**

21. **Khám thai lần đầu vào ...(3 tháng đầu)...., lần 2 vào(3 tháng giữa) lần 3 vào ...(3 tháng cuối)...**

II. Câu hỏi mức độ hiểu

22. **Nguy cơ gây dị dạng thai nhi do thuốc xảy ra nhiều nhất ở giai đoạn nào của thai kỳ**

- A.. @8 tuần đầu sau thụ thai.
- B. Ba tháng giữa.
- C. Ba tháng cuối.
- D . Suốt thai kỳ.

23. **Tất cả các loại kháng sinh sau đây đều có chống chỉ định trong lúc mang thai, NGOẠI TRỪ:**

- A. Tetracyclin
- B. @Penicillin
- C. Chloramphenicol
- D. Bactrim

24. **Nang hoàng tuyến ở buồng trứng thường gặp nhất ở trong trường hợp:**

- A. Đa thai
- B. Chửa ngoài dạ con
- C. @Chửa trứng
- D. Sảy thai

25. **Khi chẩn đoán xác định thai lưu phải:**

- A. Nạo bỏ thai ngay
- B. Cho uống thuốc gây sảy thai ngay
- C.. @Cho bệnh nhân làm các xét nghiệm cần thiết trước khi chấm dứt thai kì.
- D. Không làm gì, hẹn bệnh nhân đến để loại bỏ thai lưu.

26. **Bệnh nhân thai lưu trong 3 tháng đầu thời kỳ thai nghén khi khám lâm sàng thường thấy 1 dấu hiệu đặc thù, đó là:**

- A. Âm đạo ra máu
 - B. Tử cung tương xứng tuổi thai
 - C. @Tử cung bé hơn so với tuổi thai
 - D. Cổ tử cung hé mở
- 27. Lần khám thai thứ nhất trong 3 tháng đầu thai kỳ nhằm mục đích:**
- A. Tiêm phòng uốn ván mũi 1
 - B. @Xác định đúng có thai, tiến hành đăng ký thai nghén
 - C. Phát hiện các bệnh lý của người mẹ
 - D. Cung cấp viên sắt.
- 28. Trong khi khám thai thử nước tiểu tìm Protein niệu:**
- A. Khi thấy thai phụ có triệu chứng phù
 - B. Khi thấy thai phụ có cao huyết áp
 - C. @ Thử trong mọi lần khám thai
 - D. Khi thai phụ có triệu chứng nhức đầu
- 29. Nhịp tim thai bình thường trong khoảng:**
- A. 100-140 lần/ phút đều rõ.
 - B. 110-150 lần/ phút đều rõ.
 - C. @ 120-160 lần/ phút đều rõ.
 - D. 130-170lần/ phút đều rõ.
- 30. Mục đích khám thai 3 tháng đầu để:**
- A. @Xác định có thai để quản lý thai nghén.
 - B. Tiên lượng cuộc đẻ.
 - C. Xác định ngôi thai.
 - D. Tiêm phòng uốn ván.
- 31. Khi có thai người phụ nữ vẫn có thể:**
- A. Đi đường xa.
 - B. Lao động bình thường kể cả việc nặng.
 - C. @ Lao động bình thường, tránh việc nặng .
 - D. Nghỉ lao động trước đẻ 4 tuần.

III. Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng

- 729. Loại thuốc nào sau đây có tác dụng gây dị tật cho thai nhi đã được chứng minh?**
- A. @Thalidomide
 - B. Các chất gây ảo giác như LSD (Lysergic Acid Dethylamide)
 - C. Corticosteroids
 - D. Thuốc chống đông (Coumarin)
- 32. Thuốc nào sau đây dùng được trong thai kỳ mà không sợ gây ảnh hưởng hại cho thai nhi:**
- A. Bactrim
 - B. Streptomycin
 - C. Vitamin K
 - D. @Insulin
- 33. Triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất đi kèm với chảy máu trong chữa trứng:**

- A. Tử cung bé hơn tuổi thai
- B. Tử cung kích thước to hơn tuổi thai, chắc
- C. @Tử cung kích thước to hơn tuổi thai và mềm
- D. Tử cung kích thước to không tương xứng với tuổi thai.

34. Khi thực hiện khám thai có mấy bước:

- A. 6 bước
- B. 7 bước
- C. 8 bước
- D. @9 bước

35. Khi khám thai sản phụ quên ngày kinh cuối cùng, đo bề cao tử cung được 24cm thì tương ứng với thai:

- A. 6 tháng
- B. 6 tháng rưỡi
- C. @7 tháng
- D. 7 tháng rưỡi

36. Khi khám một thai phụ 8 tháng. Theo dõi lúc đầu thai kỳ huyết áp đo là 120/70 mmHg, hiện tại huyết áp đo được 140/80 cần xử trí:

- A. Cho nghỉ ngơi tại nhà, uống thuốc hạ huyết áp
- B. @Cho nghỉ ngơi tại nhà, tái khám sau 1 tuần hoặc khi có triệu chứng bất thường
- C. Cho nhập viện
- D. Không cần điều trị gì vì huyết áp không cao

37. Mỗi ngày nhu cầu phụ nữ mang thai cần trung bình:

- A. 1500 - 2000 kcal
- B. 2000 - 2500 kcal
- C. @2500 - 3000 kcal
- D. 3000 - 3500 kcal

38. Chọn 1 câu đúng về tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai:

- A. Tiêm 2 mũi liền 1 lúc, bất kỳ thời gian nào trong thai kỳ
- B. @Tiêm 2 mũi, mũi thứ nhất từ tháng thứ 4 trở đi và mũi thứ 2 cách mũi đầu ít nhất 1 tháng và phải trước khi đẻ ít nhất 1 tháng.
- C. Chỉ cần tiêm 1 mũi nếu thai phụ đã được tiêm phòng uốn ván ở lần đẻ trước.
- D. Chỉ những phụ nữ có nguy cơ đẻ rơi hoặc đẻ tại nhà mới cần tiêm.

39. Một sản phụ đến khám thai, đo chiều cao tử cung là 32cm, vòng bụng 95cm. Trọng lượng thai của sản phụ này được dự kiến là:

- A. 3000g.
- B. @3200g.
- C. 3500g.
- D. 3700g.

40. Chăm sóc và quản lý thai nghén tốt sẽ ...(phát hiện được những thai nghén có nguy cơ cao)...., xử trí đúng ...(sẽ làm giảm được tử vong và bệnh tật cho cả mẹ và thai cũng như sơ sinh).....và hạ thấp ...(tỷ lệ tử vong chu sản).... trẻ nhẹ cân khi sinh.