

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG NGÔI MẶT, NGÔI TRÁN, NGÔI NGANG

I. Câu hỏi mức độ nhớ lại

- Tất cả những câu sau đây về ngôi mặt đều đúng, NGOẠI TRỪ:**
 - Là một loại ngôi dọc, đầu ở dưới và ngửa tối đa.
 - Có thể là nguyên phát hay thứ phát do ngôi chồm cúi không tốt.
 - Bướu cổ thai nhi có thể là nguyên nhân dẫn đến ngôi mặt.
 - @Hiếm gặp hơn ngôi mông.
- Hãy chọn câu đúng về đường kính lọt của ngôi mặt cầm sau:**
 - Thượng chằm – cầm.
 - Hạ chằm – cầm.
 - Hạ cằm - thóp trước.
 - @Úc – thóp trước.
- Chuyển dạ thai đủ tháng, ngôi mặt cầm sau, ối đã vỡ, hãy chọn hướng xử trí đúng nhất:**
 - @Mổ lấy thai.
 - Dùng ngón tay cho vào miệng thai nhi, xoay từ cầm sau ra cầm trước.
 - Dùng forceps xoay từ cầm sau ra cầm trước.
 - Cho thuốc tăng co giúp ngôi thai bình chỉnh thêm.
- Chọn câu đúng cho chỉ định nội xoay ngôi ngang trong những trường hợp sau đây?**
 - Con so.
 - Con rạ, ối vỡ.
 - Không có bất xứng đầu chậu.
 - @Thai thứ hai trong song thai.
- Nguyên nhân gây ra ngôi ngang có thể là:**

A. Tử cung dị dạng.	@Đ/S
B. Tử cung của người đẻ nhiều lần.	@Đ/S
C. Thai già tháng.	Đ/@S
D. Rau tiền đạo.	@Đ/S
E. Rau bong non.	Đ/@S

- Trong trường hợp ngôi mặt, chỉ có thể đẻ được nếu cầm quay về phía....*phía trước***
.....
- Ngôi trán là ngôi mà phần trán trình diện trướceo trên**
- Ngôi vai là ngôi có trục của thai nhi nằm.....*vuông góc*với trục của tử cung**

II. Câu hỏi mức độ hiểu

9. Chuyển dạ thai đủ tháng, ngôi trán, ối còn, cổ tử cung mở 3 - 4 cm, chọn hướng xử trí thích hợp:

- A. @Mổ lấy thai.
- B. Bấm ối.
- C. Bấm ối, theo dõi trong một thời gian ngắn, nếu ngôi thai không xuống được thì mổ lấy thai.
- D. Không bấm ối, theo dõi thêm xem đầu có cúi thêm hoặc ngửa thêm không.

10. Ngôi ngang trong ba tháng giữa của thai kỳ, hướng xử trí thích hợp nhất là:

- A. @Không xử trí gì đặc biệt, chỉ theo dõi tiếp thai kỳ.
- B. Nội xoay thai.
- C. Ngoại xoay thai.
- D. Chụp x-quang khung chậu.

11. Chọn một câu sai khi nói về ngôi mặt trong các câu sau:

- A. Khám ngoài có dấu hiệu nhát rìu
- B. Mốc của ngôi là cằm
- C. Tiên lượng cuộc đẻ khó hơn so với ngôi chòm.
- D. @Kiểu cằm sau có thể đẻ được đường âm đạo

12. Trong sổ ngôi mặt, tăng sinh môn thường bị rách phức tạp là do:

- A. Đầu ngửa để sổ
- B. Đầu cúi để sổ
- C. Đường kính chằm - trán sổ cuối cùng
- D. @Đường kính thượng chằm - cằm sổ cuối cùng

13. Chọn câu đúng nhất cho chẩn đoán xác định ngôi trán:

- A. Trong thời kỳ chuyển dạ
- B. Trong thời kỳ mang thai và chuyển dạ
- C. Chẩn đoán được qua khám ngoài
- D. @Chỉ chẩn đoán được khi cổ tử cung đã mở sờ được mốc ngôi

14. Chọn câu đúng: trong quá trình tiến triển, ngôi thóp trước có thể:

- A. @Trở thành ngôi chòm nếu cúi tốt hơn
- B. Trở thành ngôi chòm nếu ngửa tốt hơn
- C. Trở thành ngôi trán nếu cúi tốt hơn
- D. Ngôi không biến đổi thành ngôi khác

15. Các ngôi bất thường có thể xử trí tại tuyến nào sau đây, chọn câu đúng nhất:

- A. Tất cả các tuyến
- B. Tuyến huyện
- C. @Tuyến có điều kiện phẫu thuật
- D. Chỉ xử trí ở tuyến tỉnh, trung ương

16. Ngôi trán có thể nhầm với :

- A. Ngôi chòm. @Đ/S
- B. Ngôi ngược hoàn toàn. Đ/@S
- C. Ngôi ngược không hoàn toàn. Đ/@S
- D. Ngôi mặt. @Đ/S
- E. Ngôi thóp trước. @Đ/S

