

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG VỖ TỬ CUNG ỒI VỖ NON, ỒI VỖ SỚM

I. Câu hỏi mức độ nhớ lại

1. Chọn một câu sai về nguyên nhân của vỡ ối non:
 - A. Đa ối.
 - B. Hở eo tử cung.
 - C. Viêm màng ối.
 - D. @Rau tiền đạo trung tâm.
2. Một trong những phương pháp sau đây *không dùng* để chẩn đoán ối vỡ:
 - A. Soi buồng ối.
 - B. Chứng nghiệm kết tinh lá dương xỉ.
 - C. @Khảo sát độ dai của dịch nhầy cổ tử cung.
 - D. Đặt băng vệ sinh sạch và khô theo dõi.
3. Về xử trí ối vỡ non, chọn một câu đúng dưới đây:
 - A. Tất cả trường hợp ối vỡ non đều phải được khởi động chuyển dạ.
 - B. Cho kháng sinh ngừa nhiễm trùng, chỉ chờ chuyển dạ tự nhiên.
 - C. @Có thể dùng corticoide trong trường hợp thai còn non tháng giúp phổi thai trưởng thành sớm.
 - D. Nếu thai còn non tháng có thể bơm dung dịch sinh lý vào buồng ối giúp thai tiếp tục phát triển.
4. Ồi vỡ non được định nghĩa là ối vỡ thời điểm:
 - A. Trước giai đoạn 2 của quá trình chuyển dạ.
 - B. Trước tuần lễ thứ 32 của thai kỳ.
 - C. @Trước khi chuyển dạ.
 - D. Trước tuần lễ thứ 38 của thai kỳ.
5. Dấu hiệu nào sau đây có giá trị nhất để chẩn đoán ối vỡ *sớm* nếu sau khi khám mở vết không thấy có nước ối đọng trong âm đạo?
 - A. Khám âm đạo qua lỗ cổ tử cung không sờ thấy màng ối.
 - B. Siêu âm thấy lượng nước ối ít.
 - C. Bề cao tử cung nhỏ lại so với lần khám trước.
 - D. @Đặt băng vệ sinh theo dõi thấy thấm ướt liên tục.
6. Những nguyên nhân nào sau đây của ối vỡ non có thể phòng ngừa được:
 - A. Đa ối
 - B. Ngôi bất thường
 - C. @Viêm màng ối
 - D. Song thai
7. Thai phụ 25 tuổi, thai 33 tuần vào viện vì ra nước âm đạo giờ thứ 2. Khám xác định có ối vỡ non, không có dấu hiệu nhiễm trùng, tim thai bình thường. Hướng xử trí thích hợp là:
 - A. Mở lấy thai
 - B. Cho kháng sinh + gây chuyển dạ ngay
 - C. Cho kháng sinh + Corticoid, chờ chuyển dạ tự nhiên
 - D. @Cho kháng sinh + Corticoid, đợi sau 24 giờ sẽ gây chuyển dạ

8. Sản phụ có thai 33 tuần vào viện vì ra nước âm đạo đã 24 giờ, kèm theo có sốt. Khám thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn ối, sốt 39°C, tim thai 180L/ph, CTC đóng kín. Xử trí thích hợp nhất là:

- A. Hạ sốt, kháng sinh, gây chuyển dạ
- B. @Hạ sốt, kháng sinh, corticoid, gây chuyển dạ
- C. Hạ sốt, kháng sinh, mổ lấy thai
- D. Hạ sốt, kháng sinh, corticoid, mổ lấy thai

9. Chọn một câu sai về ối vỡ sớm:

- A. @Gây ngôi thai bất thường
- B. Gây chuyển dạ kéo dài
- C. Gây suy thai
- D. Gây nhiễm khuẩn ối

	Đ	S
10. Ới vỡ non là ối vỡ khi bắt đầu chuyển dạ		S
11. Nước ối có pH kiềm	Đ	
12. Viêm âm đạo- cổ tử cung dễ dẫn đến ối vỡ non	Đ	
13. Ới vỡ non thường gây nhiễm khuẩn ối	Đ	
14. Ới vỡ non xảy ra ở người bị hở eo cổ tử cung	Đ	
15. Khi gặp ối vỡ non thai đủ tháng thì ta nên chờ cuộc chuyển dạ tiến triển tự nhiên	Đ	
16. Corticoides được dùng để kích thích phổi thai nhi trưởng thành trong ối vỡ non mà thai thai dưới 35 tuần	Đ	
17. Ới vỡ non làm tăng tỷ lệ tử vong chu sinh	Đ	
18. Trong ối vỡ non không nên dùng kháng sinh vì sợ thai bị ảnh hưởng		S

19. Ới vỡ non là ối vỡ khi.....(Chưa có dấu hiệu chuyển dạ).....và ối vỡ sớm là ối vỡ khi(Đã có dấu hiệu chuyển dạ nhưng cổ tử cung chưa mở hết).....

20. Xử trí ối vỡ non ở tuyến xã là:

- A. Tư vấn.....
- B. Cho kháng sinh.....
- C. Chuyển lên tuyến trên.....

II. Câu hỏi mức độ hiểu

21. Khi gặp một trường hợp ối vỡ non mà thai chưa đủ tháng, ở tuyến dưới cần phải làm :

- A. Cho kháng sinh và theo dõi

- B. Tư vấn, có thể nằm ở nhà đợi chuyển dạ
- C. @Tư vấn, cho kháng sinh và chuyển lên tuyến trên
- D. Cho kháng sinh, khởi phát chuyển dạ